

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt12_slap_4	Datum afname: 2012
Geboortedatum: 1953	Logopedist:
Medische diagnose: Multiple (3) CVA's	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	x klein O traag x asymmetrisch t.n.v. links / rechts	O gespannen x slap	O ongecoördineerd O onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x klein O traag	O kaakgeklemd O slap	O onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	O klein O traag O asymmetrisch t.n.v. links / rechts	O gespannen x slap	O ongecoördineerd x onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x vervormd	O verlengd	O verkort
Consonanten:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	x slap	O gespannen	x onnauwkeurig O verlengd
Clusters:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O schwa- insertie	O gereduceerd	x onnauwkeurig
Woorduitstempeling:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	O klank- / lettergreepherhalingen	x klank- / lettergreepomissies	

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: trager, waardoor betere woorduitstempeling. Later door vermoeidheid weer slechter

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	x slap O gespannen	x langzaam O dysritmisch	O toename vervorming
ta	x slap O gespannen	x langzaam x dysritmisch	O toename vervorming
ka	x slap O gespannen	x langzaam O dysritmisch	O toename vervorming
pataka	x slap O gespannen	x langzaam O dysritmisch	O patroonverstoring O toename vervorming

Opmerkingen: de dysritmische component is licht te duiden

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x hyper	O hypo	O variërend	O souffles
-------------	----------------------	---------	--------	-------------	------------

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x hees O tremor O krakerig	O schor O staccato	O diplofoon O falset	O afoon O onvast
Stemgebruik:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x hypotoon	O hypertoon		
Luidheid:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O hard	x zacht	O ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	<u>0</u> - 1 - 2 - 3	O hoog	O laag	O ongecontroleerd	

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing
Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume O gespannen O geforceerd
Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit: licht hees x afwijkende duur: 10 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal
Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie
Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal
Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters
Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters
Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties O variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: bij lezen tempo langzamer en daardoor prosodie onnatuurlijker

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: O normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
x scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt
Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.
O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.: zit in rolstoel

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
x ja* O spastisch x atactisch O hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
x slap { O motoneuropathisch O dystonie
O myogeen
O bulbaair
x UUMN
O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	<u>2 incidentele herhalingen</u>
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
<u>4 ernstige dysartrie</u>	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: