

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt13_slap_4	Datum afname: 2011
Geboortedatum: 1945	Logopedist:
Medische diagnose: CVA linkerhemisfeer	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag x slap O onwillekeurige bew.
 x asymmetrisch t.n.v. rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
 O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag x slap O onwillekeurige bew.
 O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd O verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap O gespannen x onnauwkeurig O verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie x gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 O klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: *Past het tempo aan bij het lezen waardoor er een betere articulatie ontstaat*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / **verslechtering**

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa O slap O langzaam O toename vervorming
 O gespannen O dysritmisch
 ta O slap O langzaam O toename vervorming
 O gespannen O dysritmisch
 ka O slap O langzaam O toename vervorming
 O gespannen O dysritmisch
 pataka x slap x langzaam O patroonverstoring
 O gespannen O dysritmisch O toename vervorming

Opmerkingen: *Soms past hij bewust zijn spreektempo aan in het spontane spreken, gaat 'uitdrukkelijker' spreken waardoor betere verstaanbaarheid.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hyper O hypo O variërend O souffles

Hardop lezen **beter/slechter** dan spontane spraak: *Soms past hij bewust zijn spreektempo aan in het spontane spreken, gaat 'uitdrukkelijker' spreken waardoor betere verstaanbaarheid.*

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen:

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees x schor O diplofoon O afoon
 O tremor O staccato O falset O onvast
 O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 O hypotoon x hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard O zacht O ongecontroleerd

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 hoog laag ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 beperkt volume gespannen x geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit x afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen: *Compenseert door meer spanning (lichte hypertonie) aan te brengen.*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: claviculair costaal x costo-abdominaal abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 onregelmatig stridor zonder fonatie stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 te snel gespannen / geperst oppervlakkig paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan tekort aan ademsteun verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen:

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon onnatuurlijk ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam acceleraties variërend snel
x gescandeerd stopprobleem startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen: *past spreektempo aan, gaat langzamer met lichte scandering (als compensatie)*

Houding

Lichaamshouding: x normaal beweging in ledematen beweging in romp
 scheef L / R flexie extensie onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal dwangstand L /R hoofd in beweging
 scheef L / R flexie extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

spraakpraxie x gebitsproblemen, nl. *heeft gebitsprothese niet in*

belastbaarheid ↓ speekselbeheersing ↓ anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* spastisch atactisch hypokinetisch hyperkinetisch { chorea/athetose
 x slap { motoneuropathisch dystonie
 myogeen
 bulbair
 x UUMN

overig:(componenten)

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Ernst:	Functionieniveau	Indicatie activiteitsniveau
	0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
	1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
	2 lichte dysartrie	2 incidentele herhalingen
	3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
	4 <u>ernstige dysartrie</u>	4 <u>communicatie m.b.v. een bekende persoon</u>
	5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: