

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt18_atactisch_2	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1953	Logopedist:
Medische diagnose: Multi-systeem Atrofie (MSA)	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
x traag O slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen x ongecoördineerd
x traag O slap O onwillekeurige bew.
O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 O vervormd x verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 O slap O gespannen x onnauwkeurig x verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie O gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 O klank- / lettergreepherhalingen O klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa O slap x langzaam O toename vervorming
O gespannen O dysritmisch
ta O slap x langzaam O toename vervorming
O gespannen O dysritmisch
ka O slap x langzaam O toename vervorming
O gespannen O dysritmisch
pataka O slap x langzaam x patroonverstoring
O gespannen O dysritmisch O toename vervorming

Opmerkingen: beweegt met hoofd mee bij trisyllabische reeks om ritme te houden.

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper O hypo O variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hees O schor O diplofoon O afoon
O tremor O staccato O falset O onvast
O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 O hypotoon O hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard O zacht O ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 O hoog O laag O ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 beperkt bereik verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 beperkt volume gespannen geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 afwijkende kwaliteit afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen: *bij glijtonen meerdere registerbreuken.*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: claviculair x costaal costo-abdominaal abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 onregelmatig stridor zonder fonatie stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 te snel gespannen / geperst x oppervlakkig paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 korte ademspan x tekort aan ademsteun verstoorde adem-
stemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 monotoon onnatuurlijk ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 monodynamisch ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam acceleraties variërend snel
x gescandeerd stopprobleem startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal beweging in ledematen beweging in romp
 scheef L / R flexie extensie onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal dwangstand L /R hoofd in beweging
 scheef L / R flexie extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

spraakapraxie gebitsproblemen, nl.

belastbaarheid ↓ speekselbeheersing ↓ anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* spastisch x atactisch hypokinetisch hyperkinetisch { chorea/athetose
 slap motoneuropathisch dystonie
 { myogeen
 bulbair
 UUMN

overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
 0 geen dysartrie 0 effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie

2 **lichte dysartrie**

3 matig ernstige dysartrie

4 ernstige dysartrie

5 zeer ernstige dysartrie/anartrie

1 **effectief ondanks kleine onvolkomenheden**

2 incidentele herhalingen

3 veelvuldige herhalingen

4 communicatie m.b.v. een bekende persoon

5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *door trage spreektempo relatief goede articulatie. Spreektempo alleen zou ernst 3 mogen zijn.*