

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt25_hypokin_4	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1953	Logopedist:
Medische diagnose: Multi-systeem Atrofie	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x klein O traag O asymmetrisch t.n.v. links / rechts	x gespannen O slap	O ongecoördineerd O onwillekeurige bew.
Kaakbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x klein O traag	O kaakgeklemd O slap	O onwillekeurige bew.
Tongbewegingen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x klein O traag O asymmetrisch t.n.v. links / rechts	O gespannen O slap	O ongecoördineerd O onwillekeurige bew.
Vocalen:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	x vervormd	O verlengd	O verkort
Consonanten:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O slap	O gespannen	x onnauwkeurig O verlengd
Clusters:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O schwa- insertie	x gereduceerd	x onnauwkeurig
Woorduitstempeling:	0 - <u>1</u> - 2 - 3	x klank- / lettergreepherhalingen		x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	O slap x gespannen	O langzaam x dysritmisch	O toename vervorming
ta	O slap x gespannen	O langzaam x dysritmisch	O toename vervorming
ka	O slap x gespannen	x langzaam x dysritmisch	O toename vervorming
pataka	x slap x gespannen	O langzaam O dysritmisch	O patroonverstoring O toename vervorming

Opmerkingen: *klinkt krachteloos door gebrek aan ademsteun. Toename afone momenten naarmate hij langer spreekt.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper O hypo O variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	x hees O tremor O krakerig	x schor O staccato	O diplofoon O falset	x afoon O onvast
Stemgebruik:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	O hypotoon	x hypertoon		
Luidheid:	0 - 1 - 2 - <u>3</u>	O hard	x zacht	x ongecontroleerd	
Gem. spreektoonhoogte:	0 - 1 - <u>2</u> - 3	O hoog	x laag	O ongecontroleerd	

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume x gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *schor* x afwijkende duur: 3 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel x gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun x verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 O langzaam x acceleraties x variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: O normaal O dwangstand L / R x hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen: *dyskinesieën hoofd, vlakke mimiek.*

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* O spastisch O atactisch x hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
O slap { O motoneuropathisch O dystonie
O myogeen
O bulbaair
O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
O geen dysartrie O effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 <u>veelvuldige herhalingen</u>
4 <u>ernstige dysartrie</u>	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: