

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt30_hyperkin_2

Datum afname : 2012

Geboortedatum: 1976

Logopedist:

Medische diagnose: ziekte van Huntington

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag O slap x onwillekeurige bew.
 x asymmetrisch t.n.v. links

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
 O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 O klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag O slap x onwillekeurige bew.
 O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 O vervormd x verlengd x verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 O slap O gespannen x onnauwkeurig O verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie x gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 x klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: *langzamer tempo, maar de vervorming blijft hetzelfde*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa O slap x langzaam O toename vervorming
 O gespannen x dysritmisch
 ta O slap x langzaam O toename vervorming
 O gespannen x dysritmisch
 ka O slap x langzaam O toename vervorming
 x gespannen x dysritmisch
 pataka O slap x langzaam O patroonverstoring
 O gespannen x dysritmisch O toename vervorming

Opmerkingen: *gaat te lang door bij diadochokinese*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper x hypo O variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees O schor O diplofoon O afoon
 O tremor O staccato O falset O onvast
 O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 O hypotoon x hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard O zacht x ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 O hoog O laag x ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 O beperkt volume x gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *hees, ongecontroleerd*
x afwijkende duur: 5 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen: /z/ *aanhouden lukt niet*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 x onregelmatig x stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun x verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen: *snuivende inademing*

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 O monotoon O onnatuurlijk x ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 O monodynamisch x ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 O langzaam O acceleraties x variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: *bij lezen betere prosodie*

Opmerkingen:

Houding

Lichaamshouding: O normaal x beweging in ledematen x beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: O normaal O dwangstand L / R x hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen: *verering onwillekeurige bewegingen bij inspanning*

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* O spastisch O atactisch O hypokinetisch x hyperkinetisch { O chorea/athetose
O slap { O motoneuropathisch { O dystonie
 { O myogeen
 { O bulbaair
 { O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
1 minimale dysartrie	1 <u>effectief ondanks kleine onvolkomenheden</u>
2 <u>lichte dysartrie</u>	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: