

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

| | |
|--|---------------------|
| Naam patiënt: pt32_hyperkin_4 | Datum afname : 2012 |
| Geboortedatum: 1967 | Logopedist: |
| Medische diagnose: ziekte van Huntington | |

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag O slap x onwillekeurige bew.
 O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
 O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein x gespannen O ongecoördineerd
 O traag O slap O onwillekeurige bew.
 O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd O verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 O slap O gespannen x onnauwkeurig O verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie O gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 x klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen slechter dan spontane spraak: *meer blokkades door onderdrukken van bewegingen in lijf.*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa O slap x langzaam O toename vervorming
 x gespannen x dysritmisch
 ta O slap x langzaam O toename vervorming
 x gespannen x dysritmisch
 ka O slap x langzaam O toename vervorming
 x gespannen x dysritmisch
 pataka O slap x langzaam O patroonverstoring
 x gespannen x dysritmisch O toename vervorming

Opmerkingen: *bij iedere aanzet tot spreken spanningsopbouw.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper O hypo x variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees x schor O diplofoon O afoon
 O tremor O staccato O falset O onvast
 O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 O hypotoon x hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard O zacht x ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 O hoog O laag x ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume x gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit x afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen: *stemblokkades bij toename spanning in lijf, maximale prestatietaken nagenoeg onmogelijk door oplopende spanning*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 x onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen: *snuivende inademing.*

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 O monotoon O onnatuurlijk x ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 O monodynamisch x ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 O langzaam O acceleraties x variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: O normaal x beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: O normaal O dwangstand L / R x hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen: *maakt functionele bewegingen van onwillekeurige bewegingen.*

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* O spastisch O atactisch O hypokinetisch x hyperkinetisch { x chorea/athetose
O slap } O motoneuropathisch } O dystonie
O myogeen
O bulbaair
O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

| | |
|------------------------------------|--|
| 0 geen dysartrie | 0 effectieve communicatie |
| 1 minimale dysartrie | 1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden |
| 2 lichte dysartrie | 2 incidentele herhalingen |
| 3 matig ernstige dysartrie | 3 <u>veelvuldige herhalingen</u> |
| 4 <u>ernstige dysartrie</u> | 4 communicatie m.b.v. een bekende persoon |
| 5 zeer ernstige dysartrie/anartrie | 5 geen mondelinge communicatie mogelijk |

Opmerkingen: