

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt40_meng_4	Datum afname : 2012
Geboortedatum: 1986	Logopedist:
Medische diagnose: meerdere traumata en epilepsie	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag x slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein kaakgeklemd onwillekeurige bew.
 traag slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag x slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd verlengd verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap gespannen onnauwkeurig verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 schwa- insertie gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter dan spontane spraak: *begint met meer pit, maar zwakt snel af.*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3

pa	x slap	x langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
ta	x slap	x langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
ka	x slap	x langzaam	<input type="radio"/> toename vervorming
	<input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	
pataka	x slap	x langzaam	<input type="radio"/> patroonverstoring
	<input type="radio"/> gespannen	<input type="radio"/> dysritmisch	<input type="radio"/> toename vervorming

Opmerkingen: *gaat bij diadochokinese te lang door, waardoor afoon op het eind.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hyper hypo variërend souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hees schor diplofoon afoon
 tremor staccato falset onvast
x krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 x hypotoon hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 hard x zacht x ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 hoog laag ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik x verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 O beperkt volume O gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *stemtremor*? O afwijkende duur: sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: O claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig O stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst O oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde adem-
stemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties O variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: O normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R x flexie O extensie x onderuit gezakt

Hoofdhouding: O normaal O dwangstand L /R O hoofd in beweging
O scheef L / R x flexie O extensie

Opmerkingen: *tonusregulatieprobleem? Zakt af en toe slap in flexie.*

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ x anders, nl. *Verliest bij drinken vocht uit de mond.*

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* O spastisch x atactisch O hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
x slap { O motoneuropathisch O dystonie
 { O myogeen
 { O bulbaair
 { O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
 0 geen dysartrie 0 effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
2 lichte dysartrie	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
4 <u>ernstige dysartrie</u>	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *atactische componenten: uitschieters en stemtremor bij MFD.*