

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verslechtering *raakt vermoeider, en daardoor heser en compenserende spanning.*

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume O gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *wilde lucht* x afwijkende duur: 13 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: x claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig x stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen slechter dan spontane spraak: *adempatroon slechter bij vermoeidheid (sneller, hoger, stridor).*

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties O variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen slechter dan spontane spraak: *bij vermoeidheid prosodie vlakker.*

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.
x belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: ___ nee
X ja* O spastisch O atactisch O hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
x slap { O motoneuropathisch { O dystonie
 { x myogeen
 { O bulbaair
 { O UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
 0 geen dysartrie 0 effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie

2 lichte dysartrie

3 **matig ernstige dysartrie**

4 ernstige dysartrie

5 zeer ernstige dysartrie/anartrie

1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden

2 **incidentele herhalingen**

3 veelvuldige herhalingen

4 communicatie m.b.v. een bekende persoon

5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *typerend voor myasthenia gravis is de toenemende vermoeidheid bij langer spreken.*