

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt7_slap_3	Datum afname: 2012
Geboortedatum: 1937	Logopedist:
Medische diagnose: CVA linkerhemisfeer	

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
 traag x slap onwillekeurige bew.
x asymmetrisch t.n.v. rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein kaakgeklemd onwillekeurige bew.
 traag slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 klein gespannen ongecoördineerd
x traag x slap onwillekeurige bew.
 asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd verlengd verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap gespannen x onnauwkeurig verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 schwa- insertie gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen **beter** dan spontane spraak: *spreekt meer bewust, tempo lager waardoor iets betere articulatie.*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa x slap x langzaam toename vervorming
 gespannen x dysritmisch
ta x slap x langzaam toename vervorming
 gespannen x dysritmisch
ka x slap x langzaam toename vervorming
 gespannen x dysritmisch
pataka x slap x langzaam patroonverstoring
 gespannen dysritmisch toename vervorming

Opmerkingen

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 hyper hypo variërend souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees x schor diplofoon afoon
 tremor staccato falset onvast
 krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 hypotoon hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 hard zacht ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 hoog laag ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 O beperkt volume O gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *hees* x afwijkende duur: 9 sec.
s/z ratio:

Opmerkingen

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: x claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig x stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun O verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties x variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.

O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ O anders, nl.

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: nee

X ja* O spastisch O atactisch O hypokinetisch O hyperkinetisch { O chorea/athetose
x slap { O motoneuropathisch { O dystonie
 { O myogeen
 { O bulbaair
 x UUMN

O overig:(componenten)

Ernst: Functieniveau Indicatie activiteitsniveau
 0 geen dysartrie 0 effectieve communicatie

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

1 minimale dysartrie	1 <u>effectief ondanks kleine onvolkomenheden</u>
2 <u>lichte dysartrie</u>	2 incidentele herhalingen
3 matig ernstige dysartrie	3 veelvuldige herhalingen
4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk
Opmerkingen:	