

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Naam patiënt: pt8_slap_3 Datum afname: 2012
 Geboortedatum: 1947 Logopedist:
 Medische diagnose: CVA linkerhemisfeer

0 = normaal 1 = licht afwijkend of twijfel 2 = matig ernstig / duidelijk afwijkend 3 = ernstig afwijkend / onmogelijk

Articulatie (spontane spraak, hardop lezen, diadochokinese)

Lipbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 O klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag x slap O onwillekeurige bew.
 x asymmetrisch t.n.v. rechts

Kaakbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 x klein O kaakgeklemd O onwillekeurige bew.
 O traag O slap

Tongbewegingen: 0 - 1 - 2 - 3 O klein O gespannen O ongecoördineerd
 O traag x slap O onwillekeurige bew.
 O asymmetrisch t.n.v. links / rechts

Vocalen: 0 - 1 - 2 - 3 x vervormd O verlengd O verkort

Consonanten: 0 - 1 - 2 - 3 x slap O gespannen x onnauwkeurig O verlengd

Clusters: 0 - 1 - 2 - 3 O schwa- insertie x gereduceerd x onnauwkeurig

Woorduitstempeling: 0 - 1 - 2 - 3 O klank- / lettergreepherhalingen x klank- / lettergreepomissies

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak: *in eerste instantie beter door meer inspanning en trager spreektempo. Daarna zwakt dit effect af het door de visusproblemen.*

Verandering kwaliteit articulatie in tijd: verbetering / verslechtering

Diadochokinese: 0 - 1 - 2 - 3 pa x slap x langzaam O toename vervorming
 O gespannen O dysritmisch
 ta x slap x langzaam O toename vervorming
 O gespannen x dysritmisch
 ka x slap x langzaam O toename vervorming
 O gespannen x dysritmisch
 pataka x slap x langzaam O patroonverstoring
 O gespannen x dysritmisch O toename vervorming

Opmerkingen: *raakt vermoeid na verloop van tijd. Spreekt soms onvloeiend, veel autocorrecties.*

Nasale resonantie (spontane spraak, hardop lezen)

Nasaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 O hyper O hypo x variërend O souffles

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Verandering kwaliteit resonans in tijd: verbetering / verslechtering

Opmerkingen: *klinkt licht hypernasaal, maar tevens hyponasaal waarschijnlijk door verkoudheid.*

Fonatie (spontane spraak, hardop lezen, glijtonen, roepen, maximale fonatieduur)

Stemkwaliteit: 0 - 1 - 2 - 3 x hees x schor O diplofoon x afoon
 O tremor O staccato O falset O onvast
 O krakerig

Stemgebruik: 0 - 1 - 2 - 3 x hypotoon O hypertoon

Luidheid: 0 - 1 - 2 - 3 O hard O zacht O ongecontroleerd

Gem. spreektoonhoogte: 0 - 1 - 2 - 3 O hoog x laag O ongecontroleerd

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Verandering kwaliteit fonatie in tijd: verbetering / verslechtering

Glijtonen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt bereik O verminderde sturing

Roepen: 0 - 1 - 2 - 3 x beperkt volume O gespannen O geforceerd

Maximale fonatieduur: 0 - 1 - 2 - 3 x afwijkende kwaliteit *hees, schor* x afwijkende duur: 6 sec.

s/z ratio:

Opmerkingen: *geen randregister mogelijk bij glijtoon. Lijkt verkouden (kucht ook regelmatig tussendoor). Soms afone momenten m.n. bij steminzet en -afloop. Naast lichte heesheid ook lichte schorheidscomponent (door verkoudheid?)*

Adem (bij spreken) (spontane spraak, hardop lezen, roepen, maximale fonatieduur)

Plaats: x claviculair x costaal O costo-abdominaal O abdominaal

Inademing: 0 - 1 - 2 - 3 O onregelmatig x stridor zonder fonatie O stridor met fonatie

Adempatroon: 0 - 1 - 2 - 3 O te snel O gespannen / geperst x oppervlakkig O paradoxaal

Adem bij fonatie: 0 - 1 - 2 - 3 x korte ademspan x tekort aan ademsteun x verstoorde ademstemkoppeling

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Prosodie (spontane spraak, hardop lezen)

Melodisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monotoon O onnatuurlijk O ongecontroleerd / uitschieters

Dynamisch accent: 0 - 1 - 2 - 3 x monodynamisch O ongecontroleerd / uitschieters

Temporeel accent: 0 - 1 - 2 - 3 x langzaam O acceleraties x variërend O snel
O gescandeerd O stopprobleem O startprobleem

Hardop lezen beter/slechter dan spontane spraak:

Opmerkingen

Houding

Lichaamshouding: x normaal O beweging in ledematen O beweging in romp
O scheef L / R O flexie O extensie O onderuit gezakt

Hoofdhouding: x normaal O dwangstand L / R O hoofd in beweging
O scheef L / R O flexie O extensie

Opmerkingen

Overige bevindingen

O spraakapraxie O gebitsproblemen, nl.
O belastbaarheid ↓ O speekselbeheersing ↓ x anders, nl. *Lijkt flink verkouden.*

Conclusie – Logopedische diagnose

Dysartrie: nee

X ja*

O spastisch

O atactisch

O hypokinetisch

O hyperkinetisch

O chorea/athetose

O dystonie

x slap { O motoneuropathisch

O myogeen

O bulbair

x UUMN

O overig:(componenten)

* bij mengvormen meerdere vormen aankruisen

Nederlandstalig dysartrieonderzoek (NDO)

Ernst:	Functionieniveau	Indicatie activiteitsniveau
	0 geen dysartrie	0 effectieve communicatie
	1 minimale dysartrie	1 effectief ondanks kleine onvolkomenheden
	2 lichte dysartrie	2 <u>incidentele herhalingen</u>
	3 <u>matig ernstige dysartrie</u>	3 veelvuldige herhalingen
	4 ernstige dysartrie	4 communicatie m.b.v. een bekende persoon
	5 zeer ernstige dysartrie/anartrie	5 geen mondelinge communicatie mogelijk

Opmerkingen: *er lijken ook wat atactische componenten*